


## ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

- ✓ Protege de 3 a 5 años (según el tipo).
- ✓ Funciona por sí solo, no tenés que hacer ni recordar nada.
- ✓ No requiere controles como otros métodos anticonceptivos.
- ✓ Puede usarse durante la lactancia.
- ✓ Reduce los cólicos menstruales.
- ✓ No se nota ni interfiere en las actividades diarias.
- ✓ Disminuye el riesgo de cáncer uterino.



### ES EL MÉTODO MÁS EFECTIVO DISPONIBLE.


con un fallo de menos de una persona por cada mil al año.

## ¿NECESITÁS AYUDA O MÁS INFORMACIÓN?

@larevultacolectivafeminista  
+54 9 299-4722618



Neuquén, julio 2024




Recordá que sólo el preservativo te protege de infecciones de transmisión sexual!


## IMPLANTE SUBDERMICO

### Un anticonceptivo muy efectivo

Consiste en una o dos barritas delgadas insertadas bajo la piel del brazo, que liberan gradualmente una hormona similar a la progesterona. Funciona evitando la ovulación y espesando el moco cervical para impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo.



## ¿QUÉ CAMBIOS PUEDE TENER CON SU USO?



- 1 Pueden aparecer molestias leves/moretón en el brazo tras la inserción, que desaparecen sin tratamiento.
- 2 Puede presentarse irregularidad en el sangrado menstrual, manchado ocasional o ausencia de sangrado por largos períodos de tiempo. No afectan la salud.
- 3 Algunas personas (5%) pueden experimentar dolores de cabeza.
- 4 El 99% de las personas no observa ningún cambio en el peso.
- 5 El implante no es visible pero puede sentirse bajo la piel.

## ¿CÓMO Y CUÁNDO SE INSERTA?

Se puede aplicar inmediatamente después de un aborto, parto o dentro de los primeros 7 días después del período menstrual para una protección inmediata.

Si se aplica en otro momento, necesitarás usar otra protección anticonceptiva, como preservativo, durante los primeros 7 días. La inserción toma unos minutos con anestesia local y requiere una venda en el brazo durante 24 horas.

## ¿CÓMO Y CUÁNDO SE RETIRA?

Si decidís cambiar de método o si deseás un embarazo, un/a profesional de la salud puede quitar el implante. Para retirarlo se aplica anestesia en la piel y se extrae en minutos a través de un pequeño corte.

Si después de los 3 o 5 años aún no deseás un embarazo podés cambiar el implante por uno nuevo.

Después de retirarlo recuperás tu fertilidad rápidamente.

